



開け口

**医薬品**

漢方製剤 **イスタック** 葛根湯内服液 第2類医薬品

**【効能・効果】** 体力中等度以上のもの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

**【用法・用量】** 成人(15才以上) 1回1本(30mL)を1日3回食間によく振ってから服用してください。

**＜用法・用量に関連する注意＞** (1)用法・用量を厳守してください。(2)15才未満の小児には服用させないでください。

**【使用上の注意】** **【相談すること】** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

皮膚：発疹・発赤、かゆみ 消化器：吐き気、食欲不振、胃部不快感 まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。偽アルドステロン症、ミオバチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄くなる)、視色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【保管及び取扱い上の注意】** (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

○本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、沈殿を生じる場合があります。よく振ってから服用してください。

お問い合わせ先：  
お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **エスエス製薬株式会社** 副作用被害救済制度 (輸入品)  
〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4 ☎0120-149-931  
<http://www.ssp.co.jp/>

**【成分】** 3本(1日量：90mL)中  
葛根湯エキス…………… 8,300mg  
カクコン 8.0g、マオウ 4.0g、ケイヒ 3.0g、  
シヤクヤク 3.0g、タイソウ 4.0g、シヨウ  
キョウ 1.0g、カンゾウ 2.0g  
上記生薬より製した軟工エキス  
添加物：果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン  
硬化ヒマシ油、クエン酸、メタリン酸Na、安息香酸Na、パラベン



使用期限

**イスタック**  
**葛根湯**  
**内服液**

第2類医薬品 30mL×3本(1日分)

30mL×3本(1日分)

**イスタック**  
**葛根湯**  
**内服液**

眠くなる成分は含んでいません

かぜの  
ひきはじめ

鼻かぜ

頭痛

肩こり

第2類医薬品

**エスエス製薬**

**イスタック**  
**葛根湯内服液**  
第2類医薬品



4 987300 041109



C501