



服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

せき・鼻みず・熱に

パブロンS小児液

第2類医薬品

〈総合かぜ薬〉

◆パブロンS小児液は、お子さまが服用しやすいオレンジ味のシロップ剤で、かぜの諸症状の緩和に適した成分を配合した総合かぜ薬です。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
 - 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります)
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること



- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 乳児。(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)があらわれたとの報告があります)
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに右記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあられる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること)
ぜんそく	

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合。
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

効能

かぜの諸症状(せき、鼻みず、発熱、のどの痛み、くしゃみ、たん、鼻づまり、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

せき・たんに



くしゃみ・
鼻みず・
鼻づまりに



のどの痛み・
発熱等に



成分

60mL中

フロムヘキシン塩酸塩	4mg	せきの原因となるたんを出しやすくします。
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます。
リゾチーム塩酸塩	20mg(力価)	鼻の炎症をしずめ、たんをやわらかくして、出しやすくします。
マレイン酸カルピノキサミン	2.5mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状をおさえます。
アセトアミノフェン	300mg	発熱、頭痛、のどの痛み等、熱と痛みをしずめます。
無水カフェイン	25mg	頭痛をしずめます。

添加物：D-ソルビトール、サッカリンNa水和物、パラベン、安息香酸、クエン酸Na水和物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、黄色5号、香料、バニリン、エタノール

用法・用量

添付の目盛付コップで次の量をはかり、1日3回毎食後、及び必要な場合には就寝前に服用してください。また場合によっては、約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用することができます。

年齢	3～6才	1～2才	3カ月～1才未満	3カ月未満
1回量	10mL 	7.5mL 	5mL 	服用しないこと
服用回数	1日3回			

[注意]

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。
- キャップを閉める前にびんの口についた液を清潔なガーゼ等でふいてください。(液が固まってキャップが開けにくくなることがあります)

安全キャップの使用方法

●開け方

- ①キャップを下に強く押しながら
- ②矢印の方向に回して開けてください。



●閉め方

- びんの口の周囲をよくふいてから、普通のキャップを閉める要領でしっかり閉めてください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6カ月以内に服用してください。(品質保持のため)



かぜをひいたお子さまの食事

★食欲がないときは…

水分やビタミン・ミネラルをしっかり補給。



★食欲がでてきたら…

栄養価が高く、消化のよいものを。もちろん水分補給も忘れずに。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **大正製薬株式会社**
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元 **明治薬品株式会社**
富山県富山市三郷6番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)