

漢方製剤 **イスタック** かっ こん とう 葛根湯内服液

第2類医薬品

〔効能・効果〕

かぜの初期症状（発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり）

〔用法・用量〕

成人（15才以上）1回1本（30mL）を1日3回食間によく振ってから服用します。

＜用法・用量に関連する注意＞（1）用法・用量を厳守してください。（2）15才未満の小児には服用させないでください。

〔成分〕3本（1日量：90mL）中

葛根湯エキス …………… 8,300mg

〔カッコン8.0g、マオウ4.0g、ケイヒ3.0g、シャクヤク3.0g、タイソウ4.0g、ショウキョウ1.0g、カンゾウ2.0g

上記生薬より製した軟エキス

添加物として、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、メタリン酸Na、安息香酸Na、パラベンを含有します。

〔使用上の注意〕

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。（3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。（4）胃腸の弱い人。（5）発汗傾向の著しい人。（6）高齢者。（7）今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。（8）次の症状のある人。むくみ、排尿困難（9）次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください（1）服用後、次の症状があらわれた場合。皮膚：発疹・発赤、かゆみ 消化器：悪心、食欲不振、胃部不快感 まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。肝機能障害：全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。偽アルドステロン症：尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。（2）5～6回服用しても症状がよくなる場合。
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

〔保管及び取扱い上の注意〕（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）使用期限をすぎたものは服用しないでください。

○本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

お問い合わせ先：

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）①

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先（輸入品）

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

☎0120-149-931



☆本品には添付文書はついていません。ケースの表示が代用しています。