

Kowa

バンテリン^γ 新ミニパット

貼ると、効きめの成分が
広がりながら浸透し、
筋肉・関節の痛みをとる

サイズは小型
インドメタシン
効きめ成分は1.0%濃度

密着
タイプ

28枚入 (1枚 7cm×10cm)

肩こりに伴う
肩の痛み

打撲

肘の痛み

腰痛

腱鞘炎

関節痛

筋肉痛

捻挫

インドメタシン1.0%配合

第2類医薬品

バンテリン^γ 新ミニパット

1.0%
インドメタシン conc.

第2類医薬品

バンテリン^{ニュー}新ミニパット

1.0%
インドメタシン
conc.

28枚入(1枚 7cm×10cm)

第2類医薬品

この説明文書は本剤とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。

開け口

外用鎮痛消炎薬(貼付剤) 第2類医薬品 バンテリン^{ニュー}新ミニパット

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.次の人は使用しないこと
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)15歳未満の小児。
- 2.次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 3.長期連用しないこと

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感
(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合	

成分・分量(膏体100g中)

成分・分量	働 き
インドメタシン 1.0g	非ステロイド性の鎮痛消炎成分で、筋肉や関節の痛みをとります。

[添加物] クロタミド、メントール、ポリアクリル酸部分中和物、カルメロースNa、エステルガム、グリセリン、D-ソルビトール、カオリン、亜硫酸水素Na、エト酸Na、セラチン、チモール、パルミチン酸デキストリン、流動パラフィン、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、乳酸

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫


用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を守ること。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用すること。(3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用すること。(4)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。(5)連続して2週間以上使用しないこと。

上手な貼り方



保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開口部のチャックをきちんとしめて密封し、保管すること。
- (5)使用期限(外箱及び薬袋に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00

副作用被害救済制度の問合せ先:(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> ☎ 0120-149-931



製造番号
使用期限

